

FLSタイムライン												
	入院当日	術前	手術	手術後当日	術後1日目～7日目	外来再診時（1～3ヵ月）	6ヵ月外来	1年外来以降	プロトコル外の活動		対象患者特定のために	
FLSにおける職種	医師	<ul style="list-style-type: none"> 診断 骨粗鬆症治療の必要性の説明 採血（骨代謝マーカー含む） 		手術	<ul style="list-style-type: none"> 術後説明の際に、投薬開始の説明、了承 	<ul style="list-style-type: none"> 治療薬の決定、開始 退院処方 退院後初回Xp時に骨密度検査オーダー 	<ul style="list-style-type: none"> 骨密度検査有無の確認 治療継続の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 骨密度検査 採血（必要に応じて） 治療継続の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 骨密度検査 採血（必要に応じて） 治療継続の確認 薬剤の変更考慮 近医への紹介 	<ul style="list-style-type: none"> 院内各部署での勉強会開催 院外への啓発活動 病診連携のしくみ作り 整形外科以外の科の先生方、メディカルスタッフへのFLS活動周知 		
	病棟看護師	<ul style="list-style-type: none"> 受け持ち看護師が対象患者のスクリーニング、電子カルテ（データベース）入力 チーム医療介入オーダー 				<ul style="list-style-type: none"> 資材の配布（治療必要性の説明） 					<ul style="list-style-type: none"> 病棟内での勉強会開催 入院患者、家族への啓蒙活動（パンフレットの掲示の案内や説明） 	<ul style="list-style-type: none"> 受け持ち患者が骨粗鬆症治療未介入の場合、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す
	外来看護師	<ul style="list-style-type: none"> 骨折既往の確認 骨粗鬆症治療歴の確認 					<ul style="list-style-type: none"> 治療開始の確認 次回骨密度検査の確認 再骨折予防手帳の確認 未来院のフォロー 	<ul style="list-style-type: none"> 治療継続の確認 次回骨密度検査の確認 未来院のフォロー 近医受診への促し 	<ul style="list-style-type: none"> 治療継続の確認 次回骨密度検査の確認 未来院のフォロー 近医受診の指示 			
	薬剤師	<ul style="list-style-type: none"> 入院時の持参薬確認（骨粗鬆症治療薬の有無） 					<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて服薬指導 			<ul style="list-style-type: none"> 簡単な骨粗鬆症治療薬の一覧表を作成し、患者に配布（医師からある程度絞り込み、自ら選択することで、治療意欲を促す） 	<ul style="list-style-type: none"> 他科で過剰と治療薬を処方されている患者のピックアップ、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す 	
	リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> 通常のリハビリ介入 				<ul style="list-style-type: none"> 通常のリハビリ介入 	<ul style="list-style-type: none"> 定期フォロー、身体機能評価 			<ul style="list-style-type: none"> 人間ドック利用者への指導（骨粗鬆症、運動療法、生活習慣病など） 介護予防教室での評価、講話（骨粗鬆症、サルコペニア、フレイルなど） 退院後通所・訪問リハを利用開始した利用者に対する追跡評価、医師への情報提供 転倒リスク評価、サルコペニア評価等 	<ul style="list-style-type: none"> 他科処方のリハビリ患者に関して、骨粗鬆症ハイリスク、転倒ハイリスク患者のFLSチームへの介入依頼を主治医に促す 	
	医療ソーシャルワーカー							<ul style="list-style-type: none"> 紹介先の検討 依頼 				<ul style="list-style-type: none"> DEXAの積極的な共同利用、宣伝
	診療放射線技師						<ul style="list-style-type: none"> 最初の術後Xp時に骨密度検査の有無チェック 	<ul style="list-style-type: none"> Xp撮影時に骨密度検査の確認 			<ul style="list-style-type: none"> 骨粗鬆症を目的としない検査（腹部CT、腹部Xpなど）で骨粗鬆症の可能性があると判断した場合、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す 	
	管理栄養士	<ul style="list-style-type: none"> 入院時栄養指導（骨を強くする食事療法について） 					<ul style="list-style-type: none"> 栄養指導（食事の確認等） 				<ul style="list-style-type: none"> 骨粗鬆症未治療の低栄養患者への介入時、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す 	
	医事課	<ul style="list-style-type: none"> コストに関する問い合わせへの対応 										
	ケアマネジャー 訪問看護						<ul style="list-style-type: none"> 服薬コンプライアンスの確認 通院の確認 				<ul style="list-style-type: none"> 骨粗鬆症未治療患者のFLSチームへの依頼 	
FLSクリニカルスタンダード(5i)イメージ	ステージ1 identification 対象患者の特定	ステージ2 Investigation 二次骨折リスクの評価			ステージ3 投薬を含む治療の開始	ステージ4 Integration 患者のフォローアップ	ステージ5 Information 患者と医療従事者への教育と情報提供		ステージ5 Information 患者と医療従事者への教育と情報提供			