

FLSタイムライン								対象患者特定のために	
	外来初診日	1週間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月以降	プロトコル外の活動			
FLSにおける職種	医師	<ul style="list-style-type: none"> <li>診断</li> <li>骨粗鬆症治療の必要性の説明</li> <li>採血（骨代謝マーカー含む）</li> <li>薬剤部資材による薬剤候補の説明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療薬の決定、開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続の確認</li> <li>副作用確認</li> <li>近医への紹介</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>近医への紹介</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>骨密度検査</li> <li>採血（必要に応じて）</li> <li>治療継続の確認</li> <li>薬剤の変更考慮</li> <li>近医への紹介</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>院内各部署での勉強会開催</li> <li>院外への啓発活動</li> <li>病診連携のしくみ作り</li> <li>整形外科以外の科の先生方、メディカルスタッフへのFLS活動周知</li> </ul>		
	病棟看護師							<ul style="list-style-type: none"> <li>入院患者のスクリーニング（骨折の既往、転倒リスク、低栄養あればチーム介入依頼）</li> </ul>	
	外来看護師	<ul style="list-style-type: none"> <li>骨折既往の確認</li> <li>骨粗鬆症治療歴の確認</li> <li>資材の配布</li> <li>同意書取得</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再骨折予防手帳の記入指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療継続の確認</li> <li>次回骨密度検査の確認</li> <li>未来院のフォロー</li> </ul>					
	薬剤師		<ul style="list-style-type: none"> <li>処方薬の評価</li> <li>副作用確認</li> <li>必要に応じて服薬指導</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>簡単な骨粗鬆症治療薬の一覧表を作成し、患者に配布（医師からある程度絞り込み、自ら選択することで、治療意欲を促す）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>他科で漫然と治療薬を処方されている患者のピックアップ、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す</li> </ul>	
	リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>身体機能評価</li> <li>運動療法介入</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>人間ドック利用者への指導（骨粗鬆症、運動療法、生活習慣病など）</li> <li>介護予防教室での評価、講話（骨粗鬆症、サルコペニア、フレイルなど）</li> <li>退院後通所・訪問リハを利用開始した利用者に対する追跡評価、医師への情報提供</li> <li>転倒リスク評価、サルコペニア評価等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>他科処方のリハビリ患者に関して、骨粗鬆症ハイリスク、転倒ハイリスク患者のFLSチームへの介入依頼を主治医に促す</li> </ul>	
	医療ソーシャルワーカー			<ul style="list-style-type: none"> <li>紹介先の検討</li> <li>依頼</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>DEXAの積極的な共同利用、宣伝</li> </ul>
	診療放射線技師	<ul style="list-style-type: none"> <li>骨密度検査</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>骨密度検査</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>骨粗鬆症を目的としない検査（腹部CT、腹部Xpなど）で骨粗鬆症の可能性があると判断した場合、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す</li> </ul>	
	管理栄養士		<ul style="list-style-type: none"> <li>栄養指導</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>栄養指導</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>骨粗鬆症未治療の低栄養患者への介入時、FLSチームへの介入依頼を主治医に促す</li> </ul>	
	医事課	<ul style="list-style-type: none"> <li>コストに関する問い合わせへの対応</li> </ul>							
	ケアマネジャー 訪問看護			<ul style="list-style-type: none"> <li>服薬コンプライアンスの確認</li> <li>通院の確認</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>骨粗鬆症未治療患者のFLSチームへの依頼</li> </ul>	
FLSクリニカルスタンダード(5i)イメージ	ステージ1 対象患者の特定	ステージ2 二次骨折リスクの評価	ステージ3 投薬を含む治療の開始	ステージ4 患者のフォローアップ	Integration	ステージ5 患者と医療従事者への教育と情報提供	Information	ステージ5 患者と医療従事者への教育と情報提供	